

### Âge du chien

| Maladie                                    | IMMUNISATION PRÉCOCE  |            | IMMUNISATION DE BASE |                 |                           |                       | VACCINATIONS DE RAPPEL |                              |
|--|---|------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
|  | à partir de 2 sem.  | 6 semaines | 8-9 semaines         | 12 semaines     | 16 semaines <sup>1)</sup> | 15 mois <sup>1)</sup> | chaque année           | tous les 3 ans <sup>2)</sup> |
| Carré                                      |   |            | ●                    | ●               | ●                         | ●                     |                        | ●                            |
| Hépatite                                   |   |            | ●                    | ●               | ●                         | ●                     |                        | ●                            |
| Parvovirose                                |   | ●          | ●                    | ●               | ●                         | ●                     |                        | ●                            |
| Leptospirose                               |   |            | ●                    | ●               | ●                         | ●                     | ●                      |                              |
| Parainfluenza<br>(toux des chenils virale) | ● <sup>3)</sup>   |            | ● <sup>4)</sup>      | ● <sup>4)</sup> |                           |                       | ● <sup>4)</sup>        |                              |
| Bordetella (toux des chenils bactérienne)  | ● <sup>3)</sup>   |            |                      |                 |                           |                       | ● <sup>3)</sup>        |                              |
| Rage                                       | Conformez-vous aux dispositions légales et aux recommandations de votre vétérinaire |            |                      |                 |                           |                       |                        |                              |

1) Consignes de vaccination de l'Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux (ASMPA) au-delà de l'autorisation officielle: selon les cas et à cause de l'influence des anticorps maternels qui sont présents en quantité variable, vous avez le choix de laisser revacciner les chiots vaccinés tôt à l'âge de 16 semaines. A partir de 12 semaines il suffit de vacciner 2 fois en l'espace de 3-4 semaines.

La vaccination de base complète se termine avec une vaccination supplémentaire contre la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose et la leptospirose à l'âge de 15 mois.

2) Consignes de vaccination de l'Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux (ASMPA) au-delà de l'autorisation officielle: premier rappel contre la maladie de Carré, l'hépatite et la parvovirose après 2 à 3 ans, ensuite rappels tous les 3 ans.

3) Vaccin intranasal en cas de risque d'infection.

4) Vaccination par injection ou par voie intranasale (en combinaison avec *Bordetella bronchiseptica*).